

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

DLP 20-3-78421568

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

ÉDITION DE LA STATION "des Pays de la Loire"

Maine-et-Loire, Loire-Atlantique, Sarthe, Vendée, Mayenne

ABONNEMENT ANNUEL : 50 F.

SERVICE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

Cité Administrative rue Dupetit-Thouars 49043 ANGERS CEDEX

Téléphone n° 66.21.32 Poste 571

BULLETIN N° 117 DE MARS 1978 - TOUS DEPARTEMENTS P 1

ARBRES FRUITIERS

TAVELURE DU POIRIER - Les projections d'ascospores sont commencées dans toutes les régions arboricoles de la circonscription. Dans la Vallée de la Loire, les variétés à débourrement précoce ont atteint ou sont sur le point d'atteindre le stade sensible C 3 D (éclatement des bourgeons et apparition du sommet des inflorescences entre les écailles et les jeunes feuilles).

Par conséquent, dans les vergers de poiriers du Maine-et-Loire, de la Loire-Atlantique, de la Sarthe, de la Vendée et de la Mayenne, un premier traitement devra être effectué au fur et à mesure que les variétés atteindront le stade sensible C 3 D.

TAVELURE DU POMMIER - Les projections d'ascospores sont également commencées, mais les pommiers n'ont pas encore atteint le stade sensible C 3 D. Il est donc encore trop tôt pour intervenir.

Les arboriculteurs devront davantage se méfier des tavelures cette année. En effet, les germes semblent devoir être plus nombreux, entraînant un risque d'attaque plus élevé.

DIDYMELLA DU FRAMBOISIER - Il est encore trop tôt pour intervenir.

COLZA

CHARANCONS DE LA TIGE - Les conditions climatiques de ces derniers jours ont permis une reprise d'activité de ces charançons.

Toutefois, les captures enregistrées par le réseau d'observations "ennemis du colza" sont très faibles ou nulles (Meigné le Vicomte : 3 le 11 Mars). Un traitement ne se justifie donc pas pour le moment, puisque le seuil d'intervention, situé à 10 charançons capturés en 24 heures, n'a jamais été observé.

Il convient d'être particulièrement vigilant, les captures pouvant devenir rapidement nombreuses si le beau temps persistait.

Il est rappelé que le colza n'est plus sensible aux attaques du charançon quand la tige a atteint 20 cm de hauteur.

MELIGETHES - Les premières captures ont été observées, mais il est trop tôt pour intervenir. Toutefois, des attaques graves pouvant avoir lieu dès l'apparition des boutons floraux, les cultures devront être surveillées attentivement.

Le Chef de la Circonscription Phytosanitaire des
" PAYS DE LA LOIRE " :

G. RIBAUT.

TIRAGE DU 13 MARS 1978